

I. Silpnai veikiantys

Hydrocortison DAK 1 %
 Linola-HN
 Premanol
 gaminami vaistinėje

II. Vidutinio stiprumo

Ftorocort
 Polcortolon

III. Stiprūs**Cutivate**

Advantan

Betnovate

Celestoderm-V

Elocon

Flucinar
 Synaflan
 Apuleinā

IV. Labai stiprūs

Betacorton

Dermovate

**Vietiška vartojamų
 gliukokortikosteroidų klasifikacija
 pagal jų santykinį uždegimą
 slopinančio poveikio stiprumą**

I. Silpnai veikiantys

- *Hydrocortisoni acetat*, 0,25-1 % (kremas, tepalas)
- *Prednisolonum*, 0,2-0,5 % (losjonas, kremas, tepalas)
- *Dexamethasonum* (kremas, tepalas)

II. Vidutinio stiprumo

- *Flumetasoni pivalas*, 0,02 % (kremas, tepalas)
- *Triamcinoloni acetonidum*, 0,03-0,1 % (aerolis, kremas, tepalas)
- *Hydrocortisoni butyras* (losjonas, kremas, tepalas), 0,1 %

III. Stiprūs

- *Fluticasoni propionas** (0,05 % kremas, 0,005 % tepalas)
 *kremas leidžiamas naudoti kūdikiams nuo 3 mėnesių. Tepalas leidžiamas naudoti vyresniems kaip vienerių metų vaikams.
- *Methylprednisoloni aceponas*, 0,1 % (kremas, tepalas)
- *Betamethasoni valeras*, 0,05-0,1 % (losjonas, kremas, tepalas)
- *Betamethasoni dipropionas*, 0,05 % (kremas, tepalas)
- *Momethasoni furoas*, 0,1 % (losjonas, kremas, tepalas)
- *Fluocinoloni acetonidum*, 0,025 % (tepalas, kremas, gelis)
- *Budesonidum*, 0,025 % (kremas, tepalas)

IV. Labai stiprūs

- *Halcinonidum*, 0,1 % (kremas, riebus kremas, losjonas, 0,1-1 %)
- *Clobetasoli propionas*, 0,05 % (losjonas, kremas, tepalas)

Parengta pagal: Lietuvos alergologų ir klinikių imunologų, Lietuvos dermatovenerologų, Lietuvos pediatrijos draugijų, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos, Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto mokomąją medžiagą (sutarimą) "Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas". Metodinės mokomosios medžiagos rengimo grupė: R.Emuzytė, R.Dubakienė, R.Kuzminskienė, N.Sulokiene, O.Ceburkovas, P.Leisyte, I.Marčiukaitiene, S.Valiukeviciene, A.Valiulis, L.Vaidelienė, E.Ražgauskas, J.Staikonienė, D.Kalibatienė, Vilnius, 2003